Shibojen terveyskysely 2019: Rodun yleisimpiä vaivoja ovat allergiat ja silmätulehdukset

Shibojen terveys- ja luonnekyselyyn saatiin 225 vastausta. Vastausten sukupuolijakauma meni lähes tasan, sillä vastaukset saatiin 113:sta nartusta ja 112:sta uroksesta. Vastauksien koirista lähes 80% oli syntynyt 2010-luvulla, 14% ennen tätä. Vastauksista 8% koski alle vuoden ikäisiä koiria. 94% vastauksista koski yhä elossa olevia koiria. Menehtyneiden koirien kohdalla kuolinsyyksi ilmoitettiin suurella osalla vanhuus, mutta myös muita yksittäisiä kuolinsyitä esiintyi. Mikään kuolinsyy ei kuitenkaan noussut esille erityisen yleisenä.


Shibanartut ovat kyselyn mukaan tyypillisesti noin 37-38 cm säkäkorkeudeltaan ja painavat noin 9-10 kiloa. Urokset puolestaan ovat yleisimmin noin 39-40 cm korkeita, mutta painossa on enemmän hajontaa – tyypillisesti urosshibojen ilmoitettiin painavan 9-13 kiloa. Kun kyselyn keskiarvoja verrataan shiban rotumääritelmään (urokset 39,5 cm, nartut 36,5 cm, sallittu vaihtelu +-1,5 cm), voidaan kyselyn perusteella nähdä suomalaisten shibojen koon pysyvän melko usein rotumääritelmän rajoissa.

81 % kyselyn täyttäneistä ilmoitti koiransa syövän hyvin.




Yli puolella koirista oli havaittu satunnaisia vaivoja tai sairauksia. Vaivoissa mainittiin tavallisia vaivoja, kuten ripuli, silmätulehdus, korvatulehdus, virtsatulehdus ja nenäpunkki. Lisäksi kyselyssä nousi esille satunnaiset kutinat ja iho-ongelmat sekä allergiat ruoka-aineille tai/ja ympäristön asioille. Lisäksi mainittiin jonkin verran nivelvaivoja, kuten selän

jumiutumista. Närästys ja ongelmat anaalirauhasten tyhjentymisessä mainittiin myös pari kertaa.



Viidesosalla koirista lääkitys käynnissä


Kyselyhetkellä jopa 21 % koirista sai lääkitystä jonkin sairauden tai vaivan hoitoon. Osa näistä oli kuuriluontoisia lääkityksiä, mutta yleisimmät kolme lääkittyä vaivaa olivat atopia, allergia ja erilaiset kivut. Voidaan pohtia, onko kyselyn vastaajissa painottunut lääkintää tarvitsevat koirat, vai voidaanko sama luku yleistää koko shibakantaan.



Rauhoituksen tai loishäädön sivuvaikutukset eivät shiboilla ole täysin poikkeuksellisia


3% shiboista oli saanut oireita loishäätöön käytetyistä valmisteista. Mikään tietty valmiste ei korostunut vastauksissa.


78% koirista, joiden osalta kysely oli täytetty, on rauhoitettu ja näistä koirista 6% on kärsinyt sivuvaikutuksista rauhoituksen yhteydessä. Muutamalla koiralla vaikutus oli kestänyt kauan tai aiheuttanut vakavan tilan ja muutamalla oli esiintynyt huonovointisuutta tai oksentelua rauhoituksen jälkeen.




Purennat shiboilla pääosin hyviä

Shibojen purennat vaikuttavat olevan pääosin kunnossa. Kyselyn koirilla oli 81% täysi hampaisto, eli noin yhdellä viidestä shibasta oli jonkinnäköisiä hammaspuutoksia. 10% shiboista oli ilmoitettu olevan synnynnäisiä hammaspuutoksia ja 12% hampaita oli poistettu. Hammaskiveä rodussa ilmenee jonkin verran, runsaasti 18 %:lla.








Iho-ongelmat ja allergiat yllättävän yleinen vaiva

Yleisiä, satunnaisia iho-ongelmia oli 29% kyselyn koirista. Näistä iho-ongelmista kärsineiden koirien tyypillisimpiä oireita olivat kutiava iho (63%), ihottuma (37%), hot spot (25%), ihokasvain (14%), laikuttainen karvanlähtö (8%), syylät (5%) ja demodex/sikaripunkki (3%).

Jopa 28% shiboista, joiden osalta kyselyyn oli vastattu, oli havaittu allergisia oireita.



Nämä allergiset oireet olivat ilmenneet:

- Iho-oireina 68,3%
- Tassuissa 42,9%
- Vatsaoireina 23,8%
- Silmissä 31,7%
- Korvissa 17,5%

Osa shiboista on allerginen ruoka-aineille, osa ympäristön ärsykkeille kuten siitepölylle ja osa molemmille. Suurta osaa koirista ei ole virallisesti allergiatestattu, vaan allergiat on selvitetty joko eliminaatiodieetillä tai päätelty ympäristön muutoksista. Mitään tiettyä yhtenäistä allergisoivaa tekijää ei noussut vastauksissa esille, mutta naudanliha ja viljat esiintyivät useammassa vastauksessa. Ympäristön allergisoivista tekijöistä useammassa vastauksessa nousi esiin siitepöly. Vastausten perusteella ruoka-aineallergiat ovat kuitenkin yleisempiä kuin ympäristön ärsykkeiden aiheuttamat allergiat. Osalla koirista on säännöllinen lääkitys allergiaan, mutta suuren osan koirista ruoka-aineallergia pysyy kurissa oikealla ruokavaliolla.

Atopia oli diagnosoitu 6%:lla koirista.



Shibojen polvissa, lonkissa, eturaajoissa ja selässä jonkin verran oireilua

Kyselyyn täytettyjen koirien osalta polvien osalta tutkittuja oli 64%, joista 57% polvet oli tutkittu virallisesti. 74% koirista oli saanut tuloksen 0/0, eli molemmat polvet ovat terveeksi tutkitut.

Polviaan on oireillut 7% koirista ja 2% polvet on jouduttu leikkaamaan. Oireilleista koirista kertovissa avoimessa kommenteissa oli useampia mainintoja ristisideongelmista, polvien luksoitumisesta löysyyden vuoksi sekä nivelrikosta.



Lonkissa oireita oli huomattu 5 %:lla vastaajien koirista – lähes kaikki nämä vastaajat mainitsivat oireiden syyksi nivelrikon. Suurimmalla osalla koirista oireilu oli alkanut jo nuorena tai keski-iässä, vain parin koiran kohdalla avoimissa kommenteissa mainittiin oireilun alkaneen vasta vanhempana. Tyypillisesti oireilu on näkynyt jäykkyytenä, ontumisena tai kirputtamisena. Oireiden hoitoon on käytetty kipulääkkeitä, laseria, hierontaa ja nivelvalmisteita.



Eturaajojen oireet näkyivät vastaajien koirilla tyypillisemmin ontumisena. Parilla vastaajista oireiden syyt olivat epäselviä, joillakin oireita selitti kyynärtulos asteella 2 tai 3 tai

irtopalalöydös. Vastausten perusteella kyynärissä virallinen tutkimustulos asteella 1 molemmissa tai toisessa jalassa ei yleensä oireile, mutta harvemmissa tapauksissa voi oireilla.




Muista luustomuutoksista mainittiin useimmin selän spondyloosi ja muutokset nikamissa tai kylkiluupareissa. Kaikissa tapauksissa luustomuutokset eivät olleet toistaiseksi aiheuttaneet näkyvää oireilua (koirat vastaushetkellä valtaosin alle 10 vuotiaita).



Kolmasosalla shiboista on ollut silmätulehdus ja silmät vuotavat joskus


Kuudellatoista vastaajalla koiran silmätarkastuksessa oli tullut esille jokin löydös. Eniten mainintoja oli ylimääräisistä ripsistä (7kpl), PPM:sta ja kaihista.

Yleisimmin ylimääräiset ripset tai PPM eivät vastauksien mukaan aiheuttaneet koiralle silmien vuotoa. Shiboilla silmien vuotaminen joskus on melko yleistä, mutta vain harvalla jatkuvaa. Kyselyn perustellaa satunnaisempi vuotokin voi kuitenkin aiheuttaa karvojen värjääntymisen silmien alta.





Silmätulehdus vaikuttaa kyselyn perusteella rodussa melko tavalliselta. Silmien vaivoilla on myös toisinaan yhteys allergiaan tai allergisiin muihin oireisiin.




Muista vaivoista yleisimpiä epämääräiset kohtaukset, herkkävatsaisuus ja kasvaimet

Epilepsiaa epäiltiin vain kahdella vastaajien koirista, mutta muista epämääräisistä kohtauksista mainintoja on yhteensä kuusitoista. Näihin epämääräisiin kohtauksiin ei ole löydetty varmaan diagnoosia tutkimuksista huolimatta. Osa kohtauksista on reverse sneezing -tyyppisiä hengityskohtauksia silloin tällöin, osa epilepsian kaltaisia tai koiran hyytymiseen johtaneita, mutta nopeasti ohi menneitä kohtauksia. Lisäksi yksittäisiä mainintoja tärinä-, pelko- tai kipukohtauksista, joihin ei tutkimuksissa ole löydetty syitä. Kahdessa tapauksessa myöhemmin on koiralta löydetty syöpä tai kasvain, joiden arvellaan

mahdollisesti vaikuttaneen kohtauksen syntyyn.





Monivalintakysymyksessä erilaisista muista vaivoista tyypillisimmin tavatuiksi nousivat herkkävatsaisuus ja/tai suolisto-ongelmat, kasvaimet, sydämeen liittyvät poikkeamat, virtsatietulehdukset sekä tulehtuneet anaalirauhaset. Herkkävatsaisuus vaatii vastauksien mukaan tarkkuutta ruokavalioon ja ilmenee yleensä ripulina.




Kolmasosalla nartuista ”narttujen vaivoja” ja kolmasosalla uroksista ”urosten vaivoja”

Ensimmäiset juoksut tulevat selvästi useimmilla shibanartuilla 6-10 kuukauden iässä. Alkukantaisella shiballa kiimaan liittyvät vaivat eivät ole epätavallisia. Kyselyn narttukoirista yli joka neljännellä oli todettu valeraskauksia ja kohtutulehdus oli todettu lähes joka kymmenennellä nartulla. Juoksut ovat useimmilla nartuilla kuitenkin säännölliset.






Uroksissa tavallisin sukupuoleen liittyvä poikkeama on selvästi toisen tai molempien kiveksien laskeutumattomuus. Lisäksi seksuaalinen ylivilkkaus, esinahan tulehdukset ja eturauhasvaivat mainittiin muutaman kerran. Vastauksissa uroksen kastrointiin oli päädytty lähes yhtä usein aggressiivisuuden tai seksuaalisen ylivilkkauden vuoksi kuin puhtaasti sen vuoksi, ettei koiralle ollut suunnitteilla jalostuskäyttöä.



Kyselyn vastauksien jalostuskoirista vajaa 30 % oli periyttänyt kivesvikaa. Shiboissa kitalakihalkion periyttämisen yleisyys on kyselyn mukaan puolestaan 5 % luokkaa.



Jäykkyys tai nivelvaivat tyypillisimpiä vanhuuden vaivoja

Noin kolmella viidestä 8 vuotta täyttäneestä shibasta oli mainintoja vanhuuden vaivoista. Niveliin ja lihaksiin liittyvät haasteet olivat tavallisimpia, mutta myös heikentynyttä kuuloa tai

näköä seniorishiboissa tavataan. Avoimissa kommenteissa nostettiin esille mm. lihaskunnon ylläpitämisen ja painonhallinnan tärkeyttä.

